

主成份：Thalidomide

商品名：Thado Capsule

中文商品名：塞得膠囊

含量：50 毫克/顆

作用：

本藥品用於對麻瘋性結節性紅斑（Erythema Nodosum Leprosum，ENL）患者及新診斷的多發性骨髓瘤患者。臨床上亦使用在愛滋病人、癌症病人，以及其他傳統治療無效之發炎或免疫相關症狀的病人身上。

用法：

1. 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
2. 一般一天服用二到八顆，一天一次或分次伴水服用，服藥時間最好在睡前或飯後間隔超過一小時後服用。

注意事項：

1. 為使病情受到良好控制並預防可能發生的副作用，請遵醫囑，並定期檢查白血球以及神經病變等測試。此藥品會導致胎兒畸形，婦女用藥前需確認未懷孕。
2. 服用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：曾有藥物過敏、其他疾病（血液、癲癇等疾病）或同時服用其他藥物。
3. 用藥前病患必須閱讀及簽署同意書，僅有病患願意完全遵照同意書的指示下，醫師才可處方 Thado® 給患者。每一個使用 Thado® 的病人都會領到一本病患用藥資訊手冊，請詳閱其內容。
4. 懷孕與哺乳病人不可服用 thalidomide，女性患者在使用前 24 小時需做驗孕測試，服用 thalidomide 的第一個月，需每星期回診接受驗孕檢查，爾後每個月檢查一次。
5. 生育婦女從使用 thalidomide 前一個月至停藥後一個月期間，都必須採用至少二種之避孕措施，其中包含一種有效之避孕方式同時外加輔助性的避孕方式，若使用口服避孕藥需告知醫師注意合併使用的藥品是否會影響避孕效果。
6. 男性患者在服用 thalidomide 期間至停藥後一個月，每一次性行為都必須全程使用保險套。
7. 本藥可能會引起昏睡，服用時應避免開車或操作機器。
8. 服用 thalidomide 後可能有頭暈、起立性低血壓的情形發生，從坐姿站立時，可先坐直數分鐘後再起身站立。
9. 有癲癇病史或有發生癲癇危險因子的病人，服用此藥品時應小心發生癲癇。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用，若已接近下一次用藥時間則略過一次，依照原定時間用藥，絕不可一次服用兩倍量。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
過敏（症狀包括：紅斑性的皮膚疹，可能伴隨發燒、心跳加快及血壓降低等）	請立即就醫
手或腳感覺麻木、刺痛或灼熱，心跳快速、緩慢或不規律，不明原因的發熱、寒顫，不尋常的挫傷或出血	請儘速就醫
暈眩、嗜睡、便秘、口乾、足部腫脹	症狀持續，則應告知醫師

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。

NTU